



AS Ida-Tallinna Keskhaigla  
Ravi 18, 10138 Tallinn  
Rg-kood 10822068  
Tel 666 1900  
E-post info@itk.ee  
www.itk.ee

## Прием для женщин с проблемами недержания мочи

**Ждем Вас на прием при непроизвольном мочеиспускании. Врач выяснит причину недержания мочи и составит план лечения.**

К недержанию мочи, или инконтиненции могут привести разные причины:

- стрессовое недержание, или недержание мочи при напряжении — наблюдается как следствие физического напряжения; причиной становится ослабление мышц тазового дна;
- недержание мочи от давления, или переполнения — моча выделяется сразу, как возникает чувство наполненности мочевого пузыря; этот тип недержания обусловлен нарушением функции мышцы мочевого пузыря;
- недержание мочи, вызванное воспалением мочевого пузыря;
- недержание мочи, вызванное опущением стенок влагалища или матки;
- свищ между мочевым пузырем и влагалищем.

Недержанию мочи способствуют также избыточный вес, опухоли, инородные тела, диабет, инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, хронический кашель, хронические запоры и др.

Недержание мочи лечится с помощью тренировок, лекарственных препаратов и хирургическим путем.