

Вакцинация

Вакцинация помогает предотвратить серьезные инфекционные заболевания.

Вакцинация проводится по графику в Тынисмяэской поликлинике (Харидусе 6) или Магдалена Тервисеая (Пярнуское шоссе 104). **Требуется предварительная регистрация через портал здоровья www.terviseportaal.ee или по телефону 666 1900.**

Предприятиям, желающим организовать вакцинацию своих сотрудников, следует обращаться по адресу anna.mjasnikova [at] itk.ee или звонить по телефону 606 7751.

В ИТК мы предлагаем следующие прививки:

- **Прививка от гепатита А (1 доза)**

Для обеспечения иммунитета против гепатита А вводят две дозы вакцины с интервалом 6-18 месяцев. Гепатит А — это воспаление печени, вызванное инфицированием вирусом гепатита А, который повреждает печень. Вирусы гепатита А передаются фекально-оральным путем, непосредственно от инфицированного человека к здоровому или через зараженную пищу и воду.

- **Вакцинация против гепатита В (1 доза)**

Вакцинация, состоящая из трех доз, обеспечивает длительную и эффективную защиту. Гепатит В представляет собой негнойное воспаление печени, вызываемое вирусом гепатита В (ВГВ). Вирус гепатита В очень заразен. Вирус гепатита В распространяется при переливании крови, введении наркотиков общими шприцами, нанесении татуировок, пирсинге, колотых ранениях, использовании загрязненных кровью предметов обихода (зубные щетки, бритвы) при микротравмах кожи и слизистых оболочек. В отличие от гепатита А, гепатит В может вызывать хроническое воспаление печени.

- **Вакцинация против гепатита А и В (1 доза)**

С помощью вакцины Twinrix можно одновременно вакцинироваться, как против гепатита А, так и против гепатита В.

Вакцинация состоит из трех доз. После первой дозы вторая доза проводится через месяц, а третья через 6 месяцев после первой.

- **Вакцинация против клещевого энцефалита для взрослых (1 доза)**

Клещи распространяют клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Защититься от клещевого энцефалита можно защитной инъекцией, вакцины против клещевого боррелиоза не существует. Защитную инъекцию против клещевого энцефалита следует начинать в апреле, тогда к моменту опасности клещей успеет сформироваться иммунитет. Полная вакцинация против клещевого энцефалита состоит из трех инъекций. Первые две инъекции делаются с интервалом в 1-3 месяца, третья — через 9 месяцев или год. Первая повторная инъекция необходима через 3 года, последующие повторные инъекции с интервалом 5 лет.

- **Вакцинация против пневмококка для взрослых (1 доза)**

Пневмококковый микроб может вызывать средний отит и синусит, а также пневмонию, менингит и сепсис.

Пневмококковую инфекцию можно предотвратить с помощью вакцинации. Пневмококковая вакцина обеспечивает защиту от некоторых подтипов пневмококков и предохраняет от менингита и сепсиса, частично также отита и пневмонии. На вакцинацию направляет ревматолог.

Вакцинация только по телефону с предварительной регистрацией [666 1900](tel:6661900)

Услуга платная.