



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Ravi 18, 10138 Tallinn
Rg-kood 10822068
Tel 666 1900
E-post info@itk.ee
www.itk.ee

Munajuhade läbitavuse uuring

Viljatuse üheks põhjuseks võib olla naise ühe või mõlema munajuha osaline või täielik mitteläbitavus, uuringu käigus hinnatakse munajuhade läbitavust spetsiaalse geeli (ExEm vaht) abil.

Munajuha mitteläbitavuse enimlevinud põhjused on:

- vaagnapõletik
- seksuaalsel teel levivad haigused, eriti klamüüdia ja gonorröa
- kõhuõõne operatsioonid
- emakaväline rasedus
- endometrioos

Munajuhade uuringu käigus hinnatakse munajuhade läbitavust spetsiaalse geeli (ExEm vaht) abil. Uuring viiakse läbi ultraheli kontrolli all menstruatsioonitsükli esimeses faasis.

Tegemist on alternatiivse võimalusega laparoskoopia ning röntgenuuringu kõrval munajuhade läbitavuse väljaselgitamiseks. Munajuhade läbitavuse uuringu teeb naistearst ambulatoorselt kirurgilise sekkumiseta ja kohaliku tuimestusega.

Uuring kestab koos ettevalmistusega 15–20 minutit. Uuringu käigus võib tunda kerget ebamugavustunnet ja vähest valulikkust. Naistearst teavitab uuringu tulemusest kohe vastuvõtul.

Rohkem infot patsiendi infomaterjalidest:

[Munajuhade läbitavuse uuring kontrastainega](#)

[Munajuhade läbitavuse uuring kontrastainega](#) (vene keeles)