

# Hallkae operatsiooni järgne meespea

Käesoleva infolehe eesmärgiks on anda patsiendile soovitusi katarakti ehk hallkae operatsioonijärgseks perioodiks.

## **Pärast hallkae operatsiooni:**

- võib esineda purutunne silmas, vähene punetus ja vesitsemine,
- vältige külmetumist,
- hoidke silma puhtana, peske laugusid ja ripsmeid ettevaatlikult,
- pesemiseks kasutage puhast vatitampooni, mida on niisutatud keedetud ja jahutatud vees,
- vältige vatitampooni kiudude sattumist silma,
- ärge vajutage opereeritud silmale,
- juukseid pestes või duši all olles hoiduge pesuvee silma sattumisest.

## **Pärast hallkae operatsiooni vajab silm järelravi silmatilkadega:**

- esimesel nädalal 5 korda päevas,
- teisel nädalal 4 korda päevas,
- kolmandal nädalal 3 korda päevas,
- neljandal nädalal 2 korda päevas,
- viiendal nädalal 1 kord päevas.

Alates kuuendast nädalast tuleb silma tilgutada kunstpisaraid, mida on võimalik osta apteegist käsimüügist.

## **Pange silmatilku nii:**

- peske käed,
- kallutage pea taha või olge lamamisasendis,
- asetage pudel silma lähedale,
- vaadake üles, tõmmake alalaug alla,
- vajutage kergelt pudelile ja vajutage 1 tilk,
- ärge puudutage pudeliotsaga silmamuna,
- sulgege silm, pilgutage paar korda.

Vajaduse korral leidke isik, kes on Teile silmatilkade panemisel abiks.

### **Pärast hallkae operatsiooni ei ole kaks nädalat lubatud:**

- töötada kummargil asendis,
- tõsta üle 3 kg raskusi,
- võtta saunas leili,
- käia kuumas vannis.

### **Pärast hallkae operatsiooni on lubatud:**

- vaadata mõõdukalt telerit või arvutiekraani,
- lugeda,
- jalutada,
- teha kodus kergemaid toiminguid ja käsitööd,
- käia duši all.

Pöörduge Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini keskusesse (Ravi 18, Tallinn) kohe, kui Teil pärast hallkae operatsiooni ilmneb:

- nägemise järsk halvenemine,
- valu silmas,
- tugev punetus opereeritud silmas.

ITK444

Kinnitatud AS ITK ravikvaliteedi komisjoni 14.10.2020 otsusega (protokoll nr 10-20)