



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Ravi 18, 10138 Tallinn
Rg-kood 10822068
Tel 666 1900
E-post info@itk.ee
www.itk.ee

Primaarne immuunpuudulikkus

Primaarse immuunpuudulikkuse (PID) korral esineb kaasasündinud geneetilise defekti tõttu mõne immuunsüsteemi osa puudulikkus või funktsiooni häire. See võib avalduda näiteks ebatavalise haigustekitaja, ebatavalise haiguskulu või haiguskestusega infektsioonidena või sageli korduvate infektsioonidena.

Meie eesmärgiks on primaarse immuunpuudulikkusega patsientide varaseim võimalik diagnoosimine ja kompleksne ravi. Immuunpuudulikkuste ravis rakendame kaasaegseid diagnostika ja ravimeetodeid ning harvem esinevate vormide korral kaasame vajadusel ka spetsialiste väljastpoolt meie haiglat. Alates 2011. aastast kuulub allergoloogia-immunoloogia keskus ülemaailmse [Jeffrey Modell Foundation](#)i immuunpuudulikkuse keskuste võrgustikku.

Soovitame konsulteerida primaarse immuunpuudulikkuse spetsialistiga, kui Teil esineb kaks või enam loetletud ohumärki:

- neli või enam ägedat keskkõrvapõletikku aastas
- kaks või enam ägedat põskkoopapõletikku aastas
- kaks või enam kuud antibiootikumravi olulise mõjuta
- kaks või enam kopsupõletikku aastas
- kasvu- ja kaaluiibe puudulikkus lapsel
- korduvad sügavad naha või siseorganite mädapõletikud
- pidev seeninfektsioon suus või nahal
- infektsioonide kontrollimiseks vajalik ravi veenisestest antibiootikumidega
- kaks või enam invasiivset infektsiooni, sh septitseemia
- immuunpuudulikkuse esinemine perekonnas

Primaarse immuunpuudulikkuse 10 ohumärki

Kui Teil või kellelgi Teie tuttavatest esineb kaks või enam allpool toodud ohumärkidest, tuleks sellest kindlasti rääkida arstiga, et selgitada välja võimalik primaarse immuunpuudulikkuse olemasolu.



1 Neli või enam ägedat keskkõrvapõletikku aastas.



2 Kaks või enam ägedat põskkoopa põletikku aastas.



3 Kaks või enam kuud antibiootikumravi olulise efektitä.



4 Kaks või enam kopsupõletikku aastas.



5 Kasvu- ja kaaluübe puudulikkus lapsel.



6 Korduvad sügavad naha- või siseorganite mädapõletikud.



7 Pidev seeninfektsioon suus või nahal.



8 Infektsioonide kontrollimiseks vajalik ravi veenisistest antibiootikumidega.



9 Kaks või enam invasiivset infektsiooni, sealhulgas septitseemia.



10 Immuunpuudulikkuse esinemine perekonnas.

Primaarne immuunpuudulikkus (PID) esineb sagedamini kui arvatakse. Primaarse immuunpuudulikkuse erinevaid vorme esineb 1:500 inimese kohta. Primaarse immuunpuudulikkuse korral esinevad lastel ja täiskasvanutel korduvad ja halvasti ravile alluvad infektsioonid. Kui patsiendil esineb kaks või enam välja toodud ohumärki, soovitame konsulteerida primaarse immuunpuudulikkuse spetsialistiga (allergoloog-immunoloog).

jm Jeffrey Modell Foundation

Käesolevad ohumärgid on väljatöötanud Jeffrey Modell Foundation'i meditsiini erikõrg.



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

