

# Lülisamba põletike ravi

**Lülisamba põletik ehk spondülodistsiid on harva esinev selgroolüli ja lüli vahetava bakteriaalset põletik.**

**Mädapõletik võib haarata lüli, lüli vahetavaid, lüli sambakanalit ja ümbritsevaid kudesid.**

Põletikku tekitavad mikroobid levivad lüli sambasse enamasti mujalt organismist verevarustuse kaudu. Põletik võib tekkida ka lüli samba operatsiooni järgselt.

Haiguse diagnoosimine on sageli keeruline, kuna kaebused on üldist laadi ja mittespetsiifilised. Patsiendil esineb tavaliselt seljavalu ja palavik, vereanalüüsides võib olla põletikunäitajate tõus. Diagnoosi täpsustamiseks on vajalik proovi võtmine verest või lüli sambast, et teha kindlaks konkreetne mikroob.

Spondülodistsiidi raviks vajab patsient nädalaid kestvat veenisisest antibiootikumravi. Varase diagnoosimise ja õige antibakteriaalse ravi korral on enamasti kirurgiline ravi välditav.

Kirurgiline ravi on vajalik, kui mädapõletiku tulemusel lüli sammas laguneb ja tekib lüli samba kõverus või halvatus.