IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Ravi 18, 10138 Tallinn
Rg-kood 10822068
Tel 666 1900
E-post info@itk.ee
www.itk.ee

Хирургическое лечение злокачественных опухолей мочевыводящих и половых органов

Мы проводим хирургическое лечение раковых опухолей надпочечников, почек, простаты, мочевого пузыря и половых органов.

Все случаи первичного диагноза злокачественной опухоли в области уро-онкологии, а также сложные случаи и случаи, требующие множественной терапии, обсуждаются на онко-урологическом консилиуме. В нем, помимо урологов, принимают участие врачи химиотерапии и лучевой терапии, радиологи и патологи. Мы давно и успешно сотрудничаем с онкологическим центром Восточно-Таллиннской центральной больницы и отделением лучевой терапии Северо-Эстонской областной больницы.

Дополнительную информация о лечении рака смотрите на странице «лечение рака» Восточно-Таллиннской центральной больницы

Хирургическое лечение рака предстательной железы

Хирургическое лечение рака простаты проводится только с использованием малоинвазивного метода: чрескожной эндоскопической радикальной простатэктомии с 3D-визуализацией.

Преимущество этого метода заключается в лучшей видимости тканей при многократном увеличении, что позволяет:

- более точно воздействовать на ткани
- лучше сохранять нервы для поддержания эрекции
- минимизировать кровопотерю
- сократить продолжительность операции

Операция проводится через небольшие разрезы на коже с помощью микроинструментов. У пациента остаются шрамы меньших размеров, после операции он испытывает меньше боли, быстрее восстанавливаются и возвращается к нормальной жизни за более короткое время.

Хирургическое лечение опухолей надпочечников

Мы проводим малоинвазивное лапароскопическое хирургическое лечение опухолей надпочечников в тесном сотрудничестве с эндокринологическим центром Восточно-Таллиннской центральной больницы.

Перед операцией на надпочечниках все пациенты проходят тщательное обследование и подготовку у эндокринологов. Послеоперационное наблюдение пациентов также осуществляется в сотрудничестве с эндокринологами.

Хирургическое лечение рака мочевого пузыря

При неинвазивных опухолях мочевого пузыря показано удаление опухоли через уретру, т.е. трансуретральная резекция мочевого пузыря (ТУРП).

В ходе операции используется окрашивание опухолевых очагов, или фотодинамическая диагностика (PDD), позволяющая более точно определить очаг опухоли и удалить его более эффективно.

Если опухоль распространилась на мышцы мочевого пузыря, обычно требуется полное удаление мочевого пузыря, называемое радикальной цистэктомией. После цистэктомии из тонкого кишечника формируется замещающий мочевой пузырь либо моча выводится через сделанное в коже отверстие в специальный мешок для сбора мочи.