IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

SCHISTOSOMA SP. MIKROSKOOPILINE UURING KESKJOA URIINIST

Uuringud	*Schistosoma* sp. natiivne mikroskoopia uriinist (keskjoa)
Mõiste	Keskpäevane uriin, mis on saadud pärast füüsilist aktiivsust, segatakse ja tsentrifuugitakse. Uriinisadet mikroskopeeritakse *Schistosoma* sp. suhtes
Näidustused	▪ Hematuuria ▪ Valulik urineerimine ▪ Põie ja kusejuha fibroos Kliinilise kahtluse korral on oluline reisianamnees endeemilisse piirkonda
Patsiendi ettevalmistus	Keskjoa uriin kogutakse ajavahemikul 12.00-15.00 pärast füüsilist koormust.
Proovivõtu vahendid	Uriini kogumisnõu
Materjali säilivus ja transport	2-8 °C juures 24 tunni jooksul
Teostamise aeg ja koht	Tööpäeviti, valveajal; mikrobioloogia labor, Pärnu mnt.104
Meetod	Natiivmikroskoopia
Referentsvahemikud	**Negatiivne**
Tõlgendus **Positiivne**	*Schistosoma haematobium* munade leid uriinis viitab urogenitaalsele skistosomiaasile
Hinnakirja kood	66502 preparaadi mikroskoopia
Kirjandus	1. Tropical Medicine Microscopy; Monica Cheesbrough; 2014 2. Practical guide to Diagnostic Parasitology; Lynne S. Garcia; 2009
Koostajad	Marina Ivanova, Linda Pirozkova