



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

SCHISTOSOMA SP. MIKROSKOOPILINE UURING KESKJOA URIINIST

Uuringud	<i>Schistosoma</i> sp. natiivne mikroskoopia uriinist (keskjoa)
Mõiste	Keskpäevane uriin, mis on saadud pärast füüsilist aktiivsust, segatakse ja tsentrifuugitakse. Uriinisadet mikroskopeeritakse <i>Schistosoma</i> sp. suhtes
Näidustused	<ul style="list-style-type: none">▪ Hematuuria▪ Valulik urineerimine▪ Põie ja kusejuha fibroos Kliinilise kahtluse korral on oluline reisianamnees endeemilisse piirkonda
Patsiendi ettevalmistus	Keskjoa uriin kogutakse ajavahemikul 12.00-15.00 pärast füüsilist koormust.
Proovivõtu vahendid	Uriini kogumismõõdu
Materjali säilivus ja transport	2-8 °C juures 24 tunni jooksul
Teostamise aeg ja koht	Tööpäeviti, valveajal; mikrobioloogia labor, Pärnu mnt.104
Meetod	Natiivmikroskoopia
Referentsvahemikud	Negatiivne
Tõlgendus	Positiivne <i>Schistosoma haematobium</i> munade leid uriinis viitab urogenitaalsele skistosomiaasile
Koodid	66502 preparaadi mikroskoopia
Kirjandus	<ol style="list-style-type: none">1. Tropical Medicine Microscopy; Monica Cheesbrough; 20142. Practical guide to Diagnostic Parasitology; Lynne S. Garcia; 2009
Koostajad	Marina Ivanova, Linda Pirozkova