

### Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud – täiskasvanud

Kompleksanalüüsi nimetus	Analüüsi nimetus	Lühend	Referentsväärtused			Ühik
			Vanus	Sugu	Väärtus	
	Alaniini aminotransferaas plasmas	P-ALAT	>18 a	M	<41	U/L
			>18 a	N	<33	U/L
	Albumiin plasmas	P-Alb	>70 a	M/N	35–46	g/L
			19–70 a	M/N	37–48	g/L
	Aluseline fosfataas plasmas	P-ALP	>19 a	M	40–129	U/L
			>19 a	N	35–104	U/L
			17–19 a	M	55–149	U/L
			17–19 a	N	45–87	U/L
	Amülaas (pankreesespetsiifiline) plasmas	P-pAmyl	>18 a	M/N	13–53	U/L
	Angiotensiini muundav ensüüm plasmas	P-ACE	>14 a	M/N	8–52	U/L
	Antistreptolüsiin O plasmas	P-ASO	>18 a	M/N	<200	kU/L
	Aspartaadi aminotransferaas plasmas	P-ASAT	>18 a	M	<40	U/L
			>18 a	N	<32	U/L
	B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment plasmas	P-NT-proBNP	≥75 a	M	<486	ng/L
			≥75 a	N	<738	ng/L
			65–74 a	M	<376	ng/L
			65–74 a	N	<301	ng/L
			55–64 a	M	<210	ng/L
			55–64 a	N	<287	ng/L
			45–54 a	M	<121	ng/L
			45–54 a	N	<249	ng/L
			18–44 a	M	<89	ng/L
			18–44 a	N	<130	ng/L
	C-reaktiivne valk plasmas	P-CRP	kõik	M/N	<5	mg/L
	Gammaglutamüül transferaas plasmas	P-GGT	>18 a	M	<60	U/L
			>18 a	N	<40	U/L
	Glükohemoglobiin veres	B-HbA1c	kõik	M/N	<6	%
			kõik	M/N	≤ 42	mmol/mol

Kompleksanalüüsi nimetus	Analüüsi nimetus	Lühend	Referentsväärtused			Ühik
			Vanus	Sugu	Väärtus	
	Glükoos plasmas	P-Gluc	>90 a	M/N	4,2–6,7	mmol/L
			60–90 a	M/N	4,6–6,4	mmol/L
			18–60 a	M/N	4,1–5,9	mmol/L
Glükoosi taluvuse proov (GTT 75 g Gluc PO)	Glükoos 0 min	P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO)	kõik	M/N	<6,0	mmol/L
	Glükoos 120 min	P-Gluc 120 min (post 75 g Gluc PO)	kõik	M/N	<7,8	mmol/L
Glükoosi taluvuse proov rasedatel (GTTgr 75 g Gluc PO)	Glükoos 0 min	P-Gluc 0 min (pre 75 g Gluc PO)	kõik	N	<5,1	mmol/L
	Glükoos 60 min	P-Gluc 60 min (post 75 g Gluc PO)	kõik	N	<10,0	mmol/L
	Glükoos 120 min	P-Gluc 120 min (post 75 g Gluc PO)	kõik	N	<8,5	mmol/L
	HDL-kolesterool plasmas	P-HDL-Chol	kõik	M/N	soovitav $\geq 1,56$	mmol/L
	Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (CKD-EPI valemi j.)	P-Crea+eGFR (CKD-EPI valemi j.)	>2 a	M/N	>60	mL/min /1.73m <sup>2</sup>
	Kolesterool plasmas	P-Chol	kõik	M/N	<5,2	mmol/L
	Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass plasmas	P-CK-MBm	kõik	M	<6	µg/L
			kõik	N	<5	µg/L
	Kreatiniin plasmas	P-Crea	>16 a	M	59–104	µmol/L
			>16 a	N	45–84	µmol/L
	Kreatiniini kinaas plasmas	P-CK	>18 a	M	<190	U/L
			>18 a	N	<170	U/L
	Kreatiniini kliirens	dU+P-Crea-C	kõik	M/N	66–143	ml/min
	Kreatiniini kliirens (1,73 m <sup>2</sup> ) kehapinna kohta	dU-P-Crea (1,73 m <sup>2</sup> )	kõik	M	94–140	mL/min /1.73m <sup>2</sup>
			kõik	N	72–110	mL/min /1.73m <sup>2</sup>
Kusihape plasmas	P-UA	kõik	M	202–417	µmol/L	
		kõik	N	143–339	µmol/L	

Kompleksanalüüsi nimetus	Analüüsi nimetus	Lühend	Referentsväärtused			Ühik
			Vanus	Sugu	Väärtus	
	Laktaadi dehüdrogenaas plasmas	P-LDH	>18 a	M	135–225	U/L
			>18 a	N	135–214	U/L
	Laktoosi taluvuse proov (50 g)	LTT (50 g Lac PO)	kõik	M/N	20 min ja/või 40 min pärast P-Gluc suurenemine >1,7 mmol/L	mmol/L
	LDL-kolesterool plasmas	P-LDL-Chol	kõik	M/N	soovituslik <3,0	mmol/L
	Lipaas plasmas	P-Lip	>18 a	M/N	13–60	U/L
	Mitte-HDL kolesterool plasmas	P-non-HDL-Chol	kõik	M/N	<3,4	mmol/L
	Müoglobiin plasmas	P-Myogl	kõik	M	28–72	µg/L
			kõik	N	25–58	µg/L
	Plasma osmolaalsus (arvutuslik), valem: (1.86xNa)+Gluc+Urea+9	P-Osmol calc	kõik	M/N	275–295	mOsm/kg
	Prokaltsitoniin plasmas	S,P-PCT	kõik	M/N	<0,05	µg/L
			otsustuspiir	M/N	>0,5	µg/L
			sepsise riskipiir	M/N	>2	µg/L
	Reumatoidfaktor plasmas	P-RF	kõik	M/N	<14	IU/ml
	Sapphapped plasmas	P-TBA	kõik	M/N	<10	µmol/L
	Triglütseriidid plasmas	P-Trigl	kõik	M/N	<2,0	mmol/L
	Troponiin T (kõrgtundlik) plasmas	P-cTnT-hs	kõik	M/N	<14	ng/L
	Tseruloplasmiin plasmas	P-Cer	kõik	M/N	0,18–0,45	g/L
	Uurea	S,P-Urea	>90 a	M/N	3,6–11	mmol/L
			51–90 a	M	3,0–9,2	mmol/L
			51–90 a	N	3,5–7,2	mmol/L
			19–50 a	M	3,2–7,3	mmol/L
			19–50 a	N	2,6–6,7	mmol/L
			14–19 a	M/N	2,6–7,5	mmol/L
	Valk plasmas	P-Prot	>18 a	M/N	64–83	g/L

Kompleksanalüüsi nimetus	Analüüsi nimetus	Lühend	Referentsväärtused			Ühik
			Vanus	Sugu	Väärtus	
Valkude fraktsioonid seerumis (S-Prot-Fr)	S-Alb-Fr		kõik	M/N	39–48	g/L
	S-a1-glob-Fr		kõik	M/N	0,9–2,4	g/L
	S-a2-glob-Fr		kõik	M/N	6–10,8	g/L
	S-b1-glob-Fr		kõik	M/N	4,7–8,3	g/L
	S-b2-glob-Fr		kõik	M/N	1,8–5,2	g/L
	S-g-glob-Fr		kõik	M/N	5,1–14	g/L
	Vitamiin D (25-OH) plasmas	P-Vit D (25-OH)	kõik	M/N	>50 – piisav luukoe normaalseks ainevahetuseks  <25 – tugev defitsiit 25–50 – mõõdukas defitsiit 50–75 – suboptimaalne tase 75–150 – optimaalne >250 – toksiline	nmol/L