IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

RhCE FENOTÜÜP

Lühend	**B-RhCE phenotype**
Mõiste	Rh veregrupisüsteemis on praeguseks kindlaks tehtud 49 antigeeni, millest C-, c-, E- ja e-antigeen moodustavad kokku RhCE fenotüübi. Anti-c on peale anti-D kliiniliselt kõige olulisem antikeha, mis võib põhjustada ägedat loote ja vastsündinu hemolüütilist tõbe
Näidustused	▪ doonorivere sobivusproov lastele ja fertiilses eas naistele
Proovivõtu vahendid	EDTA (K2/K3E) katsuti
Materjali säilivus ja transport	Veri: 2–8 ºC 72 tundi
Teostamise aeg ja koht	Ööpäev läbi, vereteenistus, Ravi 18
Mõõtmismeetod	Seroloogiline aglutinatsioonireaktsioon geeltehnikal
Referentsvahemikud	**CCee, ccEE, ccEe, Ccee, ccee**
Tõlgendus	▪ enne plaaniliste sobivusproovide teostamist määratakse lastel ja fertiilses eas naistel RhCE fenotüüp ▪ kui patsiendi RhCE fenotüüp ei ole CcEe, sobitatakse talle fenotüübile vastavad doosid, et vältida iatrogeensete erütrotsütaarsete antikehade tekkimist
TK hinnakirja koodid	66408
Kirjandus	1. Hillyer CD, Shaz B, (2011) Transfusion medicine and hemostasis: 124-125 2. Hillyer CD, Strauss RG, Luban NL (2004) Handbook of pediatric transfusion medicine: 195-197
Koostajad	Natali Viikant