Immuunstaatuse uuringud, HLA, koesobivusuuringud

Analüüsi nimetus	Lühend	Katsuti	Uuringumaterjal	Materjali säilivus	Vastuse saamise aeg
CD19, CD20 rakud veres	B-CD19, CD20	EDTA (K2/K3E) katsuti	veri	18–25 °C 24 tundi, materjal saata koheseslt E-N	2 tööpäeva jooksul
Clostridium tetani toksiini vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-*C tetani* tox IgG	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	2–8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt -20 °C	1 nädal
Corynebacterium diphtheriae toksiini vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-*C diphtheriae* tox IgG	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	2–8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt -20 °C	1 nädal
Granulotsüütide fagotsütoosivõime paneel (voolutsütomeetria)	B-Granulocyte DHR panel Fc	Liitiumhepariiniga katsuti	veri	18–25 °C 24 tundi, materjal saata koheseslt E-N	2 tööpäeva jooksul
Haemophilus influenzae tüüp B vastane IgG seerumis	S-*H influenzae* B IgG	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	2–8 °C 2 päeva, pikemalt -20 °C	2 nädalat
HLA B27 alleel	B-HLA B27	EDTA (K2/K3E) katsuti	veri	2–8 °C 7 päeva, pikemat aega -20 °C	1 nädala jooksul
Immuunglobuliin A seerumis/plasmas	S,P-IgA	Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti	plasma	15–25 °C 8 kuud, 2–8 °C 8 kuud, -20 °C 8 kuud	Tööpäeva jooksul, E–P
Immuunglobuliin G alaklassid 1–4 seerumis	S-IgG 1-4	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	2–8 °C 8 päeva, -20 °C 1 kuu	1 nädal
Immuunglobuliin G seerumis/plasmas	S,P-IgG	Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti	plasma	15–25 °C 4 kuud, 2–8 °C 8 kuud, -20 °C 8 kuud	Tööpäeva jooksul, E–P
Immuunglobuliin M seerumis/plasmas	S,P-IgM	Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti	plasma	15–25 °C 2 kuud, 2–8 °C 4 kuud, -20 °C 6 kuud	Tööpäeva jooksul, E–P

Väljatrükk on kehtiv trükkimise kuupäeval

Analüüsi nimetus	Lühend	Katsuti	Uuringumaterjal	Materjali säilivus	Vastuse saamise aeg
Komplemendi komponendi C1 inhibiitor seerumis	S-C1 inhibitor	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	2–8 °C 8 päeva, -20 °C 12 kuud	1 nädal
Komplemendi komponendi C1 inhibiitori funktsioon seerumis	S-C1 inh, functional	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	Toatemp 6 tundi, pikemalt -20 °C	1 kuu
Komplemendi komponent C3 seerumis/plasmas	S,P-C3	Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti	plasma	20–25 °C 2 päeva, 2–8 °C 8 päeva, -20 °C 8 päeva	Tööpäeva jooksul, E–P
Komplemendi komponent C4 seerumis/plasmas	S,P-C4	Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti	plasma	20–25 °C 2 päeva, 2–8 °C 8 päeva, -20 °C 3 kuud	Tööpäeva jooksul, E–P
Komplemendi süsteemi sõeluuring seerumis	S-C1–C9 screen panel	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	Hoida toatemp 1 tund, seejärel eraldada seerum ja säilitada edasi -70 °C	1 kuu
Krüoglobuliinid seerumis	S-Cryo	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	37 °C 1 tund	1 nädal
Lümfotsüütide alaklassid veres	B-Lymph	EDTA (K2/K3E) katsuti	veri	18–25 °C 24 tundi, materjal saata koheselt E-N	2 tööpäeva jookul
Lümfotsüütide alaklasside laiendatud paneel	B-Lymph extend	EDTA (K2/K3E) katsuti	veri	18–25 °C 24 tundi, materjal saata koheselt E-N	2 tööpäeva jooksul
Salmonella typhi Vi polüsahhariidi vastane IgG seerumis	S-S typhi Vi IgG	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	+2…+8 °C 48 tundi, –20 °C pikemaajaliselt	1 kuu
Streptococcus pneumoniae kapsulaarse polüsahhariidi vastane IgG seerumis	S-*S pneumoniae* PCP IgG	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	2–8 °C 2 päeva, pikemalt -20 °C	2 nädalat